<https://doi.org/10.47183/mes.2025-321>

УДК 57.024:57.026

ТРАНСГЕНЕЗ ПО ГЕНУ *ACE2* УСИЛИВАЕТ ПАМЯТЬ О ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ В МОДЕЛИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА У МЫШЕЙ

Ю.А. Тимошина[✉], Т.С. Дейнекина, Е.В. Савинкова, В.С. Юдин, А.А. Кескинов, В.В. Макаров, Э.А. Андрияннова

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Федерального медико-биологического агентства, Москва, Россия

Введение. Развитие симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) определяется комплексом факторов, которые не ограничиваются принадлежностью к классическим нейротрансмиттерным системам мозга или стрессовым гормонам. В частности, в механизмы ПТСР возможно вовлечение ренин-ангиотензин-альдостероновой системы мозга.

Цель. Изучение влияния экспрессии гена *hACE2* ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа (*ACE2*) на тревожность и восприимчивость к психофизиологическому стрессу при моделировании ПТСР-подобного состояния у мышей, осуществленном с применением электрошока (ЭШ) конечностей.

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на самцах мышей линий C57Bl/6N и k18-hACE2 возрастом 4–5 месяцев. Было сформировано три группы мышей линии C57Bl/6N: группа «контроль» ($n = 7$); группа «электрошок (ЭШ)» ($n = 7$); группа «ЭШ + лизиноприл» ($n = 7$); две группы мышей линии k18-hACE2: группа «контроль» ($n = 7$); группа «ЭШ» ($n = 8$). Проведено обусловливание реакции страха по Павлову с использованием ЭШ конечностей в качестве безусловного стимула. Мыши группы «ЭШ + лизиноприл» в течение 28 дней после психофизиологической травмы получали лизиноприл в дозе 10 мг/кг в сутки с питьевой водой. Оценку экспрессии реакции страха, отражающей память о психофизиологической травме, проводили на 7-е и 28-е сутки после воздействия ЭШ. Величину экспрессии реакции страха оценивали по относительному времени замирания. Для оценки общей локомоторной активности использовали тест «открытое поле». Оценку стратегии стресс-зависимого поведения изучали в тесте подвешивания за хвост; оценку тревожности — в тестах «светло-темная камера» и «приподнятый крестообразный лабиринт». Оценку пространственной навигации и динамики пространственного обучения проводили в тесте «лабиринт Барнса». Поведенческие параметры оценивали при помощи программного обеспечения ANY-maze Video-Tracking Software. Статистический анализ проведен с помощью пакета ПО Prism GraphPad 10.0.

Результаты. При моделировании ПТСР-подобного состояния с помощью ЭШ конечностей у мышей линии k18-hACE2 с экспрессией гена гуманизированного *ACE2* под контролем промотора гена цитокератина выявлена более выраженная способность, по сравнению с мышами линии C57Bl/6N, к запоминанию и удержанию памяти об условном стимуле/контексте травмирующего события. После воздействия ЭШ у мышей линии k18-hACE2 тревожность в тесте «светло-темная камера» была ниже по сравнению с мышами линии C57Bl/6N. При этом наблюдали снижение двигательной активности в тесте «открытое поле» и не обнаруживали изменений в пространственной памяти в тесте «лабиринт Барнса». Применение лизиноприла, ингибитора ACE, у мышей линии C57Bl/6N в течение 28 дней после ЭШ не приводило к снижению травматической памяти, что свидетельствует о том, что промнестический эффект экспрессии гена *hACE2* не является следствием системной гипотензии, и указывает на участие центральных механизмов в реализации эффекта гена *hACE2* при формировании патологического фенотипа.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о влиянии гена *hACE2* на формирование реакции на стресс у мышей, а именно, экспрессия *hACE2* у мышей сопровождается усилением памяти о психофизиологической травме и снижением экстинкции памяти о травме по сравнению с мышами дикого типа, что может определяться модуляцией активности ACE2-зависимого каскада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в мозге. Уменьшение регулирования активности РААС при применении ингибитора ACE лизиноприла с гипотензивным действием не оказывало влияния на память у мышей дикого типа.

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство; *hACE2*; тревожность; память; лизиноприл

Для цитирования: Тимошина Ю.А., Дейнекина Т.С., Савинкова Е.В., Юдин В.С., Кескинов А.А., Макаров В.В., Андрияннова Э.А. Трансгенез по гену *ACE2* усиливает память о психофизиологической травме в модели посттравматического стрессового расстройства у мышей. *Медицина экстремальных ситуаций*. 2025;27(3):341–350. <https://doi.org/10.47183/mes.2025-321>

Финансирование: исследование выполнено без спонсорской поддержки.

Соответствие принципам этики: исследования выполнены в соответствии с Директивой 2010/63/EU Европейского парламента и совета Европейского союза от 22 сентября 2010 г. и одобрены Комиссией по биоэтике ФГБУ «ЦСП» ФМБА России (протокол № 2 от 15.02.2024).

Потенциальный конфликт интересов: А.А. Кескинов — научный редактор журнала «Медицина экстремальных ситуаций», остальные авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

✉ Тимошина Юлия Анатольевна yutimoshina@cspfmfa.ru

Статья поступила: 28.11.2024 **После доработки:** 03.06.2025 **Принята к публикации:** 01.08.2025 **Online first:** 20.08.2025

ACE2 GENE TRANSGENESIS ENHANCES MEMORY OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL TRAUMA IN MOUSE MODELS OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER

Yulia A. Timoshina[✉], Tatiana S. Deinekina, Elena V. Savinkova, Vladimir S. Yudin, Anton A. Keskinov, Valentin V. Makarov, Elmira A. Anderzhanova

Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks of the Federal Medical and Biological Agency, Moscow, Russia

© Ю.А. Тимошина, Т.С. Дейнекина, Е.В. Савинкова, В.С. Юдин, А.А. Кескинов, В.В. Макаров, Э.А. Андрияннова, 2025

Introduction. The development of symptoms in post-traumatic stress disorder (PTSD) is determined by a set of factors, which are not limited to classical neurotransmitter systems in the brain or stress hormones. In particular, the brain renin-angiotensin-aldosterone system may be involved in the mechanisms of PTSD.

Objective. To study the effect of *hACE2* expression, angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) gene, on anxiety and susceptibility to psychophysiological stress in mice in the foot electroshock (FS) model of PTSD.

Materials and methods. The experiments were conducted using 4–5-month-old male C57Bl/6N and k18-hACE2-KI mice. C57Bl/6N mice were divided into three groups: control ($n = 7$); the foot shock (FS) ($n = 7$); FS + lisinopril ($n = 7$). k18-hACE2-KI mice were divided into two groups: control ($n = 7$) and the FS ($n = 8$). Pavlovian fear conditioning was performed using FS as an unconditioned stimulus. Mice in the FS + lisinopril group received lisinopril at a dose of 10 mg/kg per day with drinking water for 28 days after psychophysiological trauma. The expression of fear, reflecting the memory of psychophysiological trauma, was assessed on day 7 and day 28 after FS exposure. The magnitude of the fear response was assessed by evaluation of the relative time of freezing. The open field test was used to assess general locomotor activity. The tail suspension test was used to assess the stress-coping strategy, while the light-dark box test and the elevated plus maze test were used to measure anxiety. The Barnes maze test was used to explore spatial navigation and spatial learning dynamics. Behavior was analyzed using the ANY-maze Video-Tracking Software. Statistical analysis was performed using the Prism GraphPad v.10.0 software.

Results. k18-hACE2-KI mice with expression of humanized *ACE2* gene under the control of the cytokeratin gene promoter showed a more pronounced ability to remember and retain the memory about the conditioned stimulus/context of the traumatic event in the PTSD-model when compared to C57Bl/6N mice. Anxiety measured in the light-dark box test was lower in k18-hACE2 mice than C57Bl/6N mice after FS. At the same time, there was a decrease in the open-field motor activity and there were no changes in spatial memory in the Barnes maze test. Lisinopril, an ACE inhibitor (28 days after FS), did not reduce traumatic memory in C57Bl/6N mice, indicating that the promnestic effect of *hACE2* gene expression is not a result of systemic hypotension and pointing at the involvement of the central mechanisms in the realization of *hACE2* gene effect in the pathological phenotype development.

Conclusions. The data indicate that the *hACE2* gene affects the stress response in mice. Specifically, the expression of *hACE2* gene in mice leads to increased memory of psychophysiological trauma and reduced extinction of traumatic memory compared to wild-type mice. This may be due to the modulation of the ACE2-dependent renin-angiotensin-aldosterone system in the brain. The decreased RAAS activity under the action of the ACE inhibitor lisinopril with a hypotensive effect did not affect memory in wild-type mice.

Keywords: post-traumatic stress disorder; *hACE2*; anxiety; memory; lisinopril

For citation: Timoshina Yu.A., Deinekina T.S., Savinkova E.V., Yudin V.S., Keskinov A.A., Makarov V.V., Andyarzhanova E.A. *ACE2* gene transgenesis enhances memory of psychophysiological trauma in mouse models of post-traumatic stress disorder. *Extreme Medicine*. 2025;27(3):341–350. <https://doi.org/10.47183/mes.2025-321>

Funding: the study was carried out without sponsorship.

Compliance with the ethical principles: the studies were conducted in accordance with Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 and approved by the Bioethics Commission of Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks of FMBA (Protocol No. 2 dated 15.02.2024).

Potential conflict of interest: Anton A. Keskinov is a scientific editor of the *Extreme Medicine* journal; the other authors declare no conflict of interest.

✉ Yulia A. Timoshina yutimoshina@cspfmba.ru

Received: 28 Nov. 2024 **Revised:** 3 June 2025 **Accepted:** 1 Aug. 2025 **Online first:** 20 Aug. 2025

ВВЕДЕНИЕ

Значимость посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в ряду других ассоциированных со стрессом заболеваний определяется высокой вероятностью ситуаций, в которых возникает угроза здоровью и жизни, высокой частотой следующих за ними нарушений психической деятельности и недостаточной эффективностью существующей профилактики и терапии заболевания [1].

Подходы к решению проблем прогнозирования исхода острого стресса высокой интенсивности и недостаточной эффективности терапии ПТСР в последнее время получают новые направления в связи с обнаружением ранее неизвестных факторов, определяющих дезадаптивные изменения в высшей нервной деятельности. Так, Hoffmann et al.; Li et al. [2] в исследовании последствий COVID-19 обнаружили, что ангиотензин-превращающий фермент 2-го типа (ACE2), выступающий в качестве основного рецептора субъединицы S1 спайкового белка вируса SARS-CoV-2, может определять не только инфицируемость, но и повышение уровня тревожности и развитие симптомов депрессии при вирусном заболевании [3].

Белок ACE2 — важный элемент ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), компоненты которой в большой степени определяют величину системного давления в кровеносном русле. ACE2 осуществляет деградацию преренного ангиотензина II (AngII) и таким образом функционально балансирует активность ACE-зависимого прогипертензивного каскада РААС [4, 5]. По данным исследования Yang et al., мыши со сверхэкспрессией гена гуманизированного *ACE2* (*hACE2*) под контролем промотора гена цитокератина k18 рассматриваются как модель вирусной инфекции с высокой нейроинвазивностью [6], течение которой характеризуется негативными изменениями в центральной нервной системе [7]. Однако в условиях сверхэкспрессии гена *ACE2* или его фармакологической активации возможно изменение баланса между AngII и его производным с антипрессорной активностью Ang1–7 в пользу последнего. Так, в исследованиях Lima et al.; Meng et al. показано, что снижение функциональной активности прогипертензивного каскада РААС в отсутствие инфекции может оказывать положительное влияние на процессы в мозге [8, 9].

Имеющиеся данные также свидетельствуют о вовлечении локальной внутримозговой РААС

в механизмы специфической активности нервной ткани [10]. В частности, в условиях острого стресса наблюдается увеличение внеклеточного содержания катепсина D в префронтальной коре [11]. Поскольку катепсин D — одна из эндопептидаз, определяющих превращение ангиотензиногена в AngI, [12, 13], при остром стрессе в мозге увеличивается вероятность образования AngII из AngI и усиливается активность РААС. Показано также, что консолидация памяти в тесте активного избегания нарушается в условиях введения AngII в область CA1 гиппокампальной формации. Эффект опосредуется активацией рецептора ангиотензина 1-го типа (AGTR1) с вовлечением ERK1/2 сигнального внутриклеточного каскада [14]. В свою очередь, уменьшение характеристической тревожности у мышей в условиях тотальной сверхэкспрессии *hACE2* связано с Ang1–7-опосредованной активацией Mas рецепторов и зависимого от нее изменения активности ГАМК-ергических нейронов в базолатеральном отделе миндалевидного тела [15, 16].

Поскольку восприимчивость к стрессу может зависеть от уровня экспрессии / функциональной активности ACE2 и/или активности РААС, представляет интерес изучение стресс-опосредуемого поведения мышей в условиях экспрессии гена *hACE2* [15] или в условиях хронического введения применяемого в клинике ингибитора ACE лизиноприла, проникающего через гематоэнцефалический барьер.

Все вышеизложенное определяет цель исследования как изучение влияния экспрессии гена *hACE2* на тревожность и восприимчивость к психофизиологическому стрессу у мышей линии k18-*hACE2* при моделировании ПТСР-подобного состояния, осуществленного с применением электрошока (ЭШ) конечностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эксперименты проводили на самцах мышей линий C57Bl/6N и k18-*hACE2* (питомник «Андреевка» Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства и «ЦСП» ФМБА России) возрастом 4–5 месяцев. Животных содержали в клетках с искусственной вентиляцией по 5–7 особей в клетке при температуре 24 °C и цикле освещения 12 ч свет / 12 ч темнота (включение света 7:00; выключение света 19:00). Вода и стандартный комбикорм — *ad libitum*.

Исследования проведены в соответствии с Директивой 2010/63/EU Европейского парламента и совета Европейского союза от 22 сентября 2010 г. и одобрены Комиссией по биоэтике ФГБУ «ЦСП» ФМБА России (протокол № 2 от 15.02.2024).

Дизайн эксперимента

Для исследования животные случайным образом были распределены на группы по 7–8 особей.

Сформировано три группы мышей линии C57Bl/6N:

1. группа «контроль» ($n = 7$);
2. группа «ЭШ» ($n = 7$);
3. группа «ЭШ + лизиноприл» ($n = 7$);

Две группы мышей линии k18-*hACE2*:

4. группа «контроль» ($n = 7$);
5. группа «ЭШ» ($n = 8$).

Учитывая, что лизиноприл применялся для фармакологического моделирования возможного гипотензивного эффекта экспрессии *hACE2*, дополнительную группу сравнения трансгенных мышей линии k18-*hACE2* «ЭШ + лизиноприл» не вводили.

Моделирование ПТСР. После габитуации мышей к условиям содержания и друг к другу в сформированных группах проводили процедуру моделирования ПТСР-подобного состояния, осуществленного с применением ЭШ конечностей, как указано ранее [17, 18]. За 2–3 дня до начала эксперимента в течение 3 мин животных габитуировали к помещенной в звукоизолирующий короб тестовой камере (16×16×32 см³), сделанной из плексигласа и оборудованной полом с электродной решеткой, соединенной с генератором постоянного тока, и видеокамерой (Fear Conditioning System, UgoBasil, Италия). Во время тестовой сессии после 1-минутного периода покоя на пол подавались последовательно, с разницей в 1 мин, два импульса с величиной силы тока 1,5 мА и длительностью 2 сек. После второго импульса животное оставляли в камере еще на 1 мин, после чего возвращали в домашнюю клетку. Мыши из контрольных групп оставались в камере ЭШ в течение 5 мин.

Введение препарата. Мыши группы «ЭШ + лизиноприл» в течение 28 дней после психофизиологической травмы получали лизиноприл в дозе 10 мг/кг в сутки с питьевой водой. Используемая доза 10 мг/кг в сутки соответствует дозам препарата, рекомендованным при терапии артериальной гипертензии у людей. До начала эксперимента в течение недели провели мониторинг суточного потребления воды для оценки фоновых значений и расчета рабочих концентраций раствора лизиноприла. Полученные значения средне-суточного потребления жидкости одним животным (4,46 мл/сутки) совпадали с данными о потреблении воды у взрослых мышей, известными из многочисленных источников литературы. На основании предварительной оценки потребления воды готовили раствор лизиноприла (АО «Алси Фарма», Россия) с такой рабочей концентрацией, чтобы ежесуточно каждое животное получало в среднем 10 мг/кг препарата. Каждый второй день раствор лизиноприла обновляли. В течение 28 дней терапевтического воздействия проводили оценку суточного потребления воды для контроля полученной дозы препарата. Тем не менее небольшие отклонения от среднего значения потребления могли оказывать влияние на выраженность конечного эффекта, что могло повлиять на конечный результат эксперимента.

Оценка памяти о ЭШ. На 7-е и 28-е сутки после воздействия ЭШ при помощи программного обеспечения ANY-maze Video-Tracking Software у мышей проводили оценку времени замирания при помещении их в тестовую камеру на 3 мин. Величину экспрессии реакции страха оценивали по относительному времени замирания (отсутствие в течение двух секунд и более любых движений, кроме как обусловленных дыхательной экскурсией грудной клетки).

Поведенческие реакции (двигательную активность, тревожность, стратегию стресс-зависимого поведения (копинга), пространственную навигацию/пространственное обучение) оценивали в батарее тестов на 29–32-й день после ЭШ.

Для оценки общей локомоторной активности использовали тест «открытое поле» (ОП). Для этого животных помещали на арену (41×41×33 см³) установки автоматической регистрации двигательной активности (Multiple Activity Cage, UgoBasil, Италия). Локомоторную активность и вертикализацию (суммарное количество стоек с опорой на стенки тестовой арены и без опоры на стенки тестовой арены) оценивали по общему числу пересечений лучей фотодетекторов, расположенных на расстоянии 2 см друг от друга на панелях по двум сторонам арены на двух горизонтальных уровнях. Тест проводили в течение 30 мин при освещении 300 люкс.

Для оценки стратегии стресс-зависимого поведения использовали тест подвешивания за хвост (ПХ). Оценку времени неподвижности проводили, регистрируя время замирания в первые три и вторые три минуты теста отдельно.

Для оценки тревожности животных использовали тест «светло-темная камера» (СТК). Тестирование проводили в камере (42×40×40 см³), разделенной на светлый и темный отсеки, равные по размеру (Light/Dark Box for Mice, UgoBasil, Италия). Оценку избегания открытого пространства (латентный период от момента посадки экспериментального животного в центр светлой камеры (СК) до момента первого захода в темную камеру (ТК), число заходов в камеры, время, проведенное в камерах, а также общую пройденную дистанцию) проводили в течение 10 минут. Освещенность СК составляла 400 люкс.

Для изучения тревожного поведения применяли также тест «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ). Лабиринт располагался на высоте 60 см от пола и состоял из открытого (80×5 см) и закрытого (80×5 см) рукавов, пересекающихся под прямым углом (Elevated Plus Maze for Mice, UgoBasil, Италия). Число заглядываний в открытые рукава (ОР), число заходов в ОР и закрытые рукава (ЗР), время, проведенное в ОР и ЗР, а также общую пройденную дистанцию оценивали в течение 5 мин. Освещенность открытых рукавов составляла 400 люкс. По результатам тестирования в ПКЛ рассчитывали индекс тревожности (ИТ) согласно формуле: $ИТ = 1 - [(время, проведенное в ОР) /$

общая длительность теста) + (число заходов в ОР / общее число заходов в рукава)] / 2 [17].

Оценку пространственной навигации и динамики пространственного обучения проводили в тесте «лабиринт Барнса» (ЛБ) с использованием открытой круглой арены диаметром 100 см (Barnes Maze for Mice, UgoBasil, Италия) при освещенности центральной части лабиринта 600–700 люкс. Лабиринт делили на 4 сегмента, под поверхностью одного из которых было размещено укрытие. Сессии обучения (первый и второй дни проведения теста, «день 1» и «день 2») и непосредственно тестирование (третий день проведения теста, «тест») длились по 3 минуты.

Детекцию параметров, оцениваемых в тестах СТК, ПКЛ, ЛБ, осуществляли с использованием программного обеспечения ANY-maze Video-Tracking Software, видеозапись производили при помощи видеокамеры DMK 22AUC03 (IMAGINSOURCE, Германия) с объективом Computar A4Z2812CS-MPIR (Megapixel, Китай).

Последовательность проведения манипуляций показана на рисунке 1.

Статистический анализ проводили с помощью пакета ПО Prism GraphPad 10.0 и выше. Данные представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки среднего значения ($M \pm SEM$). Учитывая размеры выборок, определявшиеся доступностью трансгенных животных, оценка нормальности распределения данных не проводилась. При этом все данные были проверены на наличие выбросов с использованием алгоритма, учитывающего нелинейную модель регрессии [19]. Для сравнения оцениваемых эффектов в группах применяли двухфакторный дисперсионный анализ (ANOVA); в случае обнаружения достоверного влияния любого исследуемого фактора проводили межгрупповые сравнения с использованием теста Тьюки (*Tukey*).

В зависимости от оцениваемого параметра и специфики тестирования устанавливали следующие основные пары главных факторов:

(1) «ЭШ» (однократное воздействие ЭШ или отсутствие ЭШ) × «генотип» (наличие или отсутствие трансгенеза по гену *hACE2*);

Рисунок подготовлен авторами по собственным данным

Рис. 1. Последовательность манипуляций для осуществления моделирования ПТСР-подобного состояния и его фенотипирования: ОП — тест «открытое поле»; СТК — тест «светло-темная камера»; ПКЛ — тест «приподнятый крестообразный лабиринт»; ПХ — тест «подвешивание за хвост»; ЛБ — тест «лабиринт Барнса»

(2) «генотип» × «время» (минуты в тесте ОП, дни при оценке замирания);

(3) «ЭШ» × «время» (дни при оценке замирания и параметров теста ЛБ);

(4) «группы» (контроль, ЭШ, ЭШ + лизиноприл) × «время» (дни при оценке замирания и параметров теста ЛБ и ПХ).

В случае оценки эффекта лизиноприла во всех поведенческих тестах, кроме оценки замирания и поведения в ЛБ и ПХ, при сравнении групп («отсутствие ЭШ» по сравнению с «ЭШ» по сравнению с «ЭШ + лизиноприл») использовали однофакторный анализ вариаций. Различия принимали за статистически достоверные при уровне значимости $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При сравнении поведенческих реакций интактных мышей линии C57Bl/6N и k18-hACE2 обнаружено влияние экспрессии *hACE2* на параметры поведенческой активности. Обнаружено снижение пройденного расстояния в ОП у интактных мышей линии k18-hACE2 в 1,2 раза по сравнению с интактными мышами линии C57Bl/6N (генотип: $F(1,12) = 16,83$, $p = 0,0015$); соответствующие данные представлены на рисунке 2а. В тесте СТК у мышей линии k18-hACE2 обнаружено статистически достоверное увеличение латентного периода до первого захода в ТК в 15,4 раза и увеличение времени, проведенного в СК, в 1,9 раза ($F_s > 7,98$, $p < 0,017$), что подтверждается результатами post-hoc анализа ($p < 0,0205$); соответствующие данные представлены на рисунке 2д, 2ж.

При моделировании ПТСР-подобного состояния установлено, что мыши линии k18-hACE2 в условиях однократного ЭШ конечностей реагировали на шокирующее воздействие сильнее, чем мыши дикого типа (сравнение средних в тесте Стьюдента, $t = 3,561$, $df = 13$, $p = 0,004$), и запоминали условный стимул / контекст травмирующего события лучше, что выразилось в увеличении времени реакции замирания после психофизиологической травмы у трансгенных мышей по сравнению с мышами линии C57Bl/6N на 7-й и 28-й дни после воздействия ЭШ (генотип: ($F(1,12) = 226,98$, $p < 0,001$; время: ($F(1,12) = 24,79$, $p = 0,0003$; генотип × время: ($F(1,12) = 8,113$, $p = 0,015$)). Более того, у этих мышей не наблюдали экстинкции страха (post-hoc: 7-й день по сравнению с 28-м днем; $p = 0,157$) (рис. 3б), тогда как мыши линии C57Bl/6N через 28 дней демонстрировали уменьшение величины экспрессии страха (post-hoc: 7-й день по сравнению с 28-м днем; $p = 0,0001$) (рис. 3а).

Психофизиологическая травма вызывала у мышей линии k18-hACE2 отсроченные изменения в поведении, профиль которых отличался от наблюдаемых у мышей линии C57Bl/6N. Через месяц после ЭШ в тесте ПХ время неподвижности у мышей линии k18-hACE2 было в 2,4 раза меньше по сравнению с тем же показателем у мышей линии C57Bl/6N в первые три минуты ($p = 0,049$) и в 1,5 раза — во вторые три минуты ($p = 0,0137$) 6-минутного теста (эффект генотипа: ($F(1,13) = 6,268$, $p = 0,029$); соответствующие данные приведены на рисунке 2в.

У трансгенных мышей, получавших воздействие ЭШ, в 14,4 раза увеличивался латентный период

до первого захода в ТК в тесте СТК по сравнению с мышами дикого типа (генотип: ($F(1,11) = 43,91$, $p < 0,001$; ЭШ: ($F(1,12) = 9,201$, $p = 0,010$; генотип × ЭШ: ($F(1,11) = 7,276$, $p = 0,021$) (рис. 2д). При сравнимом уменьшении числа заходов в СК и ТК у животных обеих экспериментальных групп после ЭШ (ЭШ: $F(1,13) = 3,134$, $p = 0,101$), только у трансгенных мышей наблюдали уменьшение времени нахождения в ТК, несимметричное увеличению времени нахождения в СК (ЭШ: ($F(1,13) = 7,486$, $p = 0,017$; генотип: $F_s > 38,47$, $p < 0,001$; генотип × ЭШ: ($F(1,11) = 7,704$, $p = 0,017$) (рис. 2е, 2ж).

При оценке тревожности в ПКЛ влияние ЭШ в целом не было селективным по отношению к мышам линии k18-hACE2 (ЭШ: $F_s < 3,279$, $p > 0,097$, генотип × ЭШ: $F_s < 2,137$, $p > 0,16$) (рис. 2з, и, к), хотя было обнаружено уменьшение дистанции, пройденной мышами линии k18-hACE2 в закрытых рукавах лабиринта, относительно величины, обнаруженной у мышей C57Bl/6N (post-hoc: $p = 0,028$) (рис. 2л). Средние величины ИТ для мышей контрольной группы линии C57Bl/6N составили $0,933 \pm 0,019$, для мышей линии C57Bl/6N, получивших ЭШ конечностей, — $0,954 \pm 0,017$, для контрольных мышей линии k18-hACE2 — $0,996 \pm 0,004$, для мышей линии k18-hACE2, получивших ЭШ конечностей, — $0,991 \pm 0,008$. Двухфакторный анализ дисперсии ИТ выявил эффект генотипа: $F(1,12) = 15,52$, $p = 0,002$; эффект ЭШ конечностей $F(1,13) = 0,345$, $p = 0,567$; эффект взаимодействия факторов $F(1,12) = 1,063$, $p = 0,323$. Последующий post-hoc тест указал на статистически достоверное различие между контрольными группами ($p = 0,005$).

Оценка двигательной активности в тесте ОП выявила влияние генотипа ($F(1,12) = 16,830$, $p = 0,002$) и ЭШ ($F(1,13) = 5,810$, $p = 0,032$) на локомоторную активность животных (рис. 2а), кроме этого, обнаружено селективное уменьшение вертикализации у мышей линии k18-hACE2 после ЭШ (генотип × ЭШ: ($F(1,12) = 5,362$, $p = 0,039$ (post-hoc: $p = 0,007$); ЭШ и генотип: $F_s < 3,7495$, $p > 0,075$) (рис. 2б).

Оценка пространственной навигации / пространственного обучения в ЛБ показала, что у мышей линии C57Bl/6N, но не у мышей линии k18-hACE2, стратегия нахождения укрытия после ЭШ оптимизируется в течение трех последовательных дней проведения теста, что выражается в увеличении доли исследования отверстий, находящихся в целевом сегменте (ЭШ: ($F(1,12) = 2,150$, $p = 0,168$; день: ($F(1,12) = 4,434$, $p = 0,028$, ЭШ × день: ($F(2,24) = 1,693$, $p = 0,205$ (post-hoc: день 1 по сравнению с третьим днем («тест»), $p = 0,049$) (рис. 2о). Это сопровождалось уменьшением времени, затраченного на нахождение укрытия (ЭШ: ($F(1,12) = 1,011$, $p = 0,335$; день: ($F(1,12) = 6,561$, $p = 0,010$, ЭШ × день: ($F(2,24) = 0,266$, $p = 0,768$ (post-hoc: день 1 по сравнению с третьим днем («тест»), $p = 0,018$) (рис. 2м). В отношении доли посещений сегмента с укрытием эффект ЭШ не был статистически достоверным ($F_s < 0,285$, $p > 0,466$) (рис. 2н).

Отдельно проанализировали эффект лизиноприла у мышей линии C57Bl/6N в модели ПТСР-подобного состояния. Лизиноприл при его хроническом пероральном применении (в дозе 10 мг/кг в сутки) не оказывал влияния на контекстуальную память в модели ПТСР-подобного состояния (post-hoc: 7 дней $p = 0,609$ и 28 дней $p = 0,341$) (рис. 3а). Средние величины ИТ

Рисунок подготовлен авторами по собственным данным

Рис. 2. Сравнение поведенческого фенотипа мышей линий C57Bl/6N и k18-hACE2 в парадигме оценки отсроченного (29–32 дня) эффекта электрошока (ЭШ) конечностей: а — локомоторная активность; б — вертикализация в тесте ОП; в — время неподвижности в тесте ПХ; характеристическая тревожность в тесте СТК: г — суммарная дистанция, пройденная в СК и ТК; д — латентный период до момента первого захода в ТК; е — число заходов в СК или ТК; ж — время, проведенное в СК или ТК; характеристическая тревожность в тесте ПКЛ; з — число заглядываний в ОР; и — число заходов в ОР или ЗР; к — время, проведенное в ОР или ЗР; л — дистанция, пройденная в ОР или ЗР; динамика пространственной навигации в тесте ЛБ: м — время до нахождения укрытия; н — доля посещения сегмента с укрытием относительно посещения всех сегментов; о — доля исследования отверстий в сегменте с укрытием относительно исследования всех укрытий

Примечание: штриховка — трансгенный генотип; результаты post-hoc сравнения между группами: * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$, **** $p < 0,0001$; результаты post-hoc сравнения между днем 1 и тестом при оценке пространственной навигации: # $p < 0,05$.

для мышей контрольной группы линии C57Bl/6N составили $0,933 \pm 0,019$, для мышей линии C57Bl/6N, получивших ЭШ конечностей, — $0,954 \pm 0,017$, для мышей линии C57Bl/6N, получавших лизиноприл после ЭШ конечностей, — $0,927 \pm 0,026$ и однофакторный анализ дисперсии не выявил различий между группами $F(2,18) = 0,446, p = 0,647$.

Не обнаружено влияния лизиноприла и в тестах ОП, ПХ, СТК, ПКР, ЛБ (рис. 4а–к). Можно отметить вероятный эффект в отношении динамики пространственной навигации / пространственного обучения

в ЛБ, но он не был подтвержден результатами статистического анализа (post-hoc: $p > 0,073$) (рис. 4з, и, к).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные данные указывают на сложный профиль эффекта экспрессии гена *hACE2* на поведение мышей. С одной стороны, интактные трансгенные мыши в тесте СТК демонстрировали увеличение резистентности к открытому освещенному пространству, что подтверждает ранее описанный анксиолитический

Рисунок подготовлен авторами по собственным данным

Рис. 3. Динамика длительности замирания у мышей линий C57Bl/6N и k18-hACE2: а — динамика длительности замирания и влияния ингибитора ACE лизиноприла (10 мг/кг в сутки) на длительность замирания у мышей линии C57Bl/6N; б — сохранение памяти о травматическом событии у мышей линии k18-hACE2

Примечание: штриховка — трансгенный генотип; результаты post-hoc сравнения между группами: ns — not significant (не значимо), * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$, **** $p < 0,0001$; ЭШ — электрошок.

эффект сверхэкспрессии гена гуманизированного ACE2 у интактных мышей [15, 16]. С другой стороны, в нашем исследовании обнаружено влияние экспрессии гена *hACE2* на формирование отсроченных последствий острого стресса при моделировании ПТСР-подобного состояния. Так, наблюдали более длительное исследование СК, опасной только эвентуально, в тесте СТК и увеличение неподвижности в тесте ПХ, потенциально носящее адаптивный характер. При этом экспрессия гена *hACE2* способствовала усилению и удержанию памяти о травмирующем событии, что выражалось в увеличении времени замирания и отсутствии экстинкции реакции замирания (то есть в неэффективности переобучения актуальной безопасности тестовой камеры) в течение месяца после психофизиологической травмы.

Усиление памяти об ЭШ может быть опосредовано увеличением восприятия ЭШ: немедленная реакция трансгенных мышей на ЭШ во время обусловливания была выше. Следует заметить, что это, по всей видимости, определяется механизмами восприятия психологической компоненты стресса, а не увеличением болевой чувствительности, поскольку в литературе имеются сведения об уменьшении ноцицепции при уменьшении эффективности сигнальной цепи с вовлечением ACE2 [20], а используемая нами трансгенная модель, напротив, предполагает усиление функции ACE2. Действительно, сравнение полученных нами результатов с характеристиками поведенческого эндофенотипа, описанного у мышей со сверхэкспрессией гена *hACE2* [15, 16], указывает на повышение активности ACE2 у мышей линии k18-hACE2, что может быть опосредовано или сверхэкспрессией гуманизированного гена, или его повышенной активностью по сравнению с мышинным геном дикого типа. Повышение активности ACE2 у мышей линии k18-hACE2, в свою очередь, может определять увеличение

продукции Ang1–7 и повышение активности ACE2/Ang1–7-зависимого каскада РААС. Соответствующая активация MasR-зависимого сигналинга в мозге мышей выступает как механизм, обеспечивающий нейропластичность и усиление памяти [21, 22], а также ангиолилитический и антидепрессивный эффект [23, 24].

В исследованиях Correa et al., Fontes et al. регуляторы РААС рассматриваются в качестве потенциальных мишеней при терапии стресса [5, 25]. В клинике ингибиторы ACE, AGTR1, а также бета-блокаторы показывают хорошие результаты при лечении ПТСР. Доклинические исследования выявляли эффекты разной направленности. В исследованиях Marvar et al. применение селективного ингибитора AGTR1 лозартана в модели ПТСР сопровождалось уменьшением памяти о травмирующем событии, увеличением ее экстинкции и сохранением уровня характеристической тревожности животных [26], тогда как Braszko; Raghavendra et al. [27, 28] сообщают об усилении травматической памяти.

В нашем эксперименте мы изучили влияние гипотензивного препарата ингибитора ACE лизиноприла на поведенческие реакции при моделировании ПТСР-подобного состояния у мышей линии C57Bl/6N. Предполагалось, что в выбранной дозе 10 мг/кг в сутки, которая соответствует клиническому терапевтическому диапазону, ангиолилитический эффект лизиноприла будет реализовываться за счет его антигипертензивного действия. Однако хроническое применение лизиноприла в течение 28 суток не повлияло ни на контекстуальную память, ни на уровень тревожности у мышей. В более ранних исследованиях Cohen et al.; Kao et al. не обнаруживали терапевтического эффекта бета-блокатора пропранолола при моделировании ПТСР-подобного состояния у мышей [17, 29]. Взятые вместе эти данные указывают на ограниченность эффекта нормализации системного давления крови в реализации терапевтических эффектов

Рисунок подготовлен авторами по собственным данным

Рис. 4. Влияние ингибитора ACE лизиноприла на показатели локомоторной активности, тревожности, эмоционального копинга и пространственной навигации у мышей линии C57Bl/6N, получавших электрошок (ЭШ): а — локомоторная активность; б — вертикализация в тесте ОП; в — длительность замирения в тесте ПХ; г — латентный период до момента первого захода в ТК; д — время нахождения в светлой и темной камерах в тесте СТК; е — число заглядываний в открытый рукав; ж — время нахождения в открытом и закрытом рукавах в тесте ПКЛ; динамика пространственной навигации в тесте ЛБ: з — время до нахождения укрытия; и — доля посещения сегмента с укрытием относительно посещения всех сегментов; к — доля исследования отверстий в сегменте с укрытием относительно исследования всех укрытий

Примечание: результаты post-hoc сравнения между группами: ns — not significant (не существенно), * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$; результаты post-hoc сравнения между данными через 1 день и третьим днем («тест») при оценке пространственной навигации: # $p < 0,05$.

бета-блокаторов, а также ингибиторов ACE, AGTR1 при терапии ПТСР.

Неэффективность лизиноприла в нашем исследовании может определяться и конечной третичной структурой гуманизованного фермента, поскольку известно, что направленность эффектов ингибиторов ACE при терапии ПТСР находится в зависимости от полиморфизма гена ACE, определяя резистентность к терапии при наличии нуклеотидного варианта TC rs4311 [30]. Вероятное увеличение экспрессии гена ACE2 на фоне хронического применения лизиноприла, уже описанное в литературе [31–35], достаточное для развития специфических для мозга ACE2/Ang1-7/

MasR-зависимых механизмов, по всей видимости, тоже не было достигнуто.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют о влиянии экспрессии гена *hACE2* на восприимчивость мышей к психофизиологическому стрессу и указывают на значимость ACE2 в формировании памяти о психофизиологической травме при моделировании ПТСР-подобного состояния, а именно: экспрессия *hACE2* у мышей сопровождается усилением памяти о психофизиологической травме и снижением экстинкции па-

мяти о травме по сравнению с мышами дикого типа, что может опосредоваться модуляцией активности ACE2-зависимого каскада внутримозговой РААС.

Уменьшение активности РААС при применении ингибитора АСЕ лизиноприла с гипотензивным действием не оказывало влияния на память у мышей дикого типа.

Литература / References

- Wang CX, Kohli R, Olaker VR, Terebuh P, Xu R, Kaelber DC, et al. Risk for diagnosis or treatment of mood or anxiety disorders in adults after SARS-CoV-2 infection, 2020–2022. *Molecular Psychiatry*. 2024;29(5):1350–60. <https://doi.org/10.1038/s41380-024-02414-x>
- Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Krüger N, Herrler T, Erichsen S, et al. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. *Cell*. 2020;181(2):271–80.e8. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.052>
- Li W, Moore MJ, Vasilieva N, Sui J, Wong SK, Berne M.A, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus. *Nature*. 2003;426(6965):450–4. <https://doi.org/10.1038/nature02145>
- Li XC, Zhang J, Zhuo JL. The vasoprotective axes of the renin-angiotensin system: Physiological relevance and therapeutic implications in cardiovascular, hypertensive and kidney diseases. *Pharmacological Research*. 2017;125:21–38. <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2017.06.005>
- Correa BHM, Becari L, Fontes MAP, Simões-e-Silva AC, Kangussu LM. Involvement of the Renin-Angiotensin System in Stress: State of the Art and Research Perspectives. *Current Neuropharmacology*. 2022;20(6):1212–28. <https://doi.org/10.2174/1570159X19666210719142300>
- Yang XH, Deng W, Tong Z, Liu YX, Zhang LF, Zhu H, et al. Mice transgenic for human angiotensin-converting enzyme 2 provide a model for SARS coronavirus infection. *Comparative Medicine*. 2007;57(5):450–9.
- Cheyne I, Gopinath VS, Muppa N, Armas AE, Gil Agurto MS, Akula SA, et al. The Neurological Implications of COVID-19: A Comprehensive Narrative Review. *Cureus*. 2024;16(5):e60376. <https://doi.org/10.7759/cureus.60376>
- Lima AM, Xavier CH, Ferreira AJ, Raizada MK, Wallukat G, Velloso EP, et al. Activation of angiotensin-converting enzyme 2/angiotensin-(1-7)/Mas axis attenuates the cardiac reactivity to acute emotional stress. *American Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology*. 2013;305(7):H1057–67. <https://doi.org/10.1152/ajpheart.00433.2013>
- Meng Y, Yu CH, Li W, Li T, Luo W, Huang S, et al. Angiotensin-Converting Enzyme 2/Angiotensin-(1-7)/Mas Axis Protects against Lung Fibrosis by Inhibiting the MAPK/NF-κB Pathway. *American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology*. 2014;50(4):723–36. <https://doi.org/10.1165/rcmb.2012-0451OC>
- Grobe JL, Xu D, Sigmund CD. An Intracellular Renin-Angiotensin System in Neurons: Fact, Hypothesis, or Fantasy. *Physiology*. 2008;23(4):187–93. <https://doi.org/10.1152/physiol.00002.2008>
- Martinelli S, Anderzhanova EA, Bajaj T, Wiechmann S, Dethloff F, Weckmann K, et al. Stress-primed secretory autophagy promotes extracellular BDNF maturation by enhancing MMP9 secretion. *Nature Communication*. 2021;12(1):4643. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-24810-5>
- Azaryan A, Barkhudaryan N, Galoyan A, Lajtha A. Action of brain cathepsin B, cathepsin D, and high-molecular-weight aspartic proteinase on angiotensins I and II. *Neurochemical Research*. 1985;10(11):1525–32. <https://doi.org/10.1007/BF02430602>
- Rukavina Mikusic NL, Pineda AM, Gironacci MM. Angiotensin-(1-7) and Mas receptor in the brain. *Exploration of Medicine*. 2021;2(3):268–93. <https://doi.org/10.37349/emed.2021.00046>
- Kerr DS, Bevilacqua LRM, Bonini JS, Rossato JI, Köhler CA, Medina JH, et al. Angiotensin II blocks memory consolidation through an AT2 receptor-dependent mechanism. *Psychopharmacology*. 2005;179(3):529–35. <https://doi.org/10.1007/s00213-004-2074-5>
- De Kloet AD, Cahill KM, Scott KA, Krause EG. Overexpression of angiotensin converting enzyme 2 reduces anxiety-like behavior in female mice. *Physiology & Behavior*. 2020;224:113002. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2020.113002>
- Wang L, De Kloet AD, Pati D, Hiller H, Smith JA, Ploquinto DJ, et al. Increasing brain angiotensin converting enzyme 2 activity decreases anxiety-like behavior in male mice by activating central Mas receptors. *Neuropharmacology*. 2016;105:114–23. <https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2015.12.026>
- Kao CY, Stalla G, Stalla J, Wotjak CT, Anderzhanova E. Norepinephrine and corticosterone in the medial prefrontal cortex and hippocampus predict PTSD-like symptoms in mice. *European Journal of Neuroscience*. 2015;41(9):1139–48. <https://doi.org/10.1111/ejn.12860>
- Kamprath K, Wotjak CT. Nonassociative learning processes determine expression and extinction of conditioned fear in mice. *Learning Memory*. 2004;11(6):770–86. <https://doi.org/10.1101/lm.86104>
- Motulsky HJ, Brown RE. Detecting outliers when fitting data with nonlinear regression — a new method based on robust nonlinear regression and the false discovery rate. *BMC Bioinformatics*. 2006;7(1):123. <https://doi.org/10.1186/1471-2105-7-123>
- Yamagata R, Nemoto W, Nakagawasai O, Takahashi K, Tan-No K. Downregulation of spinal angiotensin converting enzyme 2 is involved in neuropathic pain associated with type 2 diabetes mellitus in mice. *Biochemical Pharmacology*. 2020;174:113825. <https://doi.org/10.1016/j.bcp.2020.113825>
- Albrecht D. Angiotensin-(1-7)-induced plasticity changes in the lateral amygdala are mediated by COX-2 and NO. *Learning Memory*. 2007;14(3):177–84. <https://doi.org/10.1101/lm.425907>
- Hellner K, Walther T, Schubert M, Albrecht D. Angiotensin-(1-7) enhances LTP in the hippocampus through the G-protein-coupled receptor Mas. *Molecular and Cellular Neuroscience*. 2005;29(3):427–35. <https://doi.org/10.1016/j.mcn.2005.03.012>
- Almeida-Santos AF, Kangussu LM, Moreira FA, Santos RAS, Aguiar DC, Campagnole-Santos MJ. Anxiolytic- and antidepressant-like effects of angiotensin-(1-7) in hypertensive transgenic (mRen2)27 rats. *Clinical Science*. 2016;130(14):1247–55. <https://doi.org/10.1042/CS20160116>
- Kangussu LM, Almeida-Santos AF, Bader M, Alenina N, Fontes MA, Santos RA, et al. Angiotensin-(1-7) attenuates the anxiety and depression-like behaviors in transgenic rats with low brain angiotensinogen. *Behavioural Brain Research*. 2013;257:25–30. <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2013.09.003>
- Fontes MA, Martins Lima A, dos Santos RAS. Brain angio-

- tensin-(1-7)/Mas axis: A new target to reduce the cardiovascular risk to emotional stress. *Neuropeptides*. 2016;56:9–17. <https://doi.org/10.1016/j.npep.2015.10.003>
26. Marvar PJ, Goodman J, Fuchs S, Choi DC, Banerjee S, Ressler KJ. Angiotensin Type 1 Receptor Inhibition Enhances the Extinction of Fear Memory. *Biological Psychiatry*. 2014;75(11):864–72. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2013.08.024>
 27. Braszko JJ. AT₂ but not AT₁ receptor antagonism abolishes angiotensin II increase of the acquisition of conditioned avoidance responses in rats. *Behavioural Brain Research*. 2002;131(1–2):79–86. [https://doi.org/10.1016/S0166-4328\(01\)00349-7](https://doi.org/10.1016/S0166-4328(01)00349-7)
 28. Raghavendra V, Chopra K, Kulkarni SK. Comparative studies on the memory- enhancing actions of captopril and losartan in mice using inhibitory shock avoidance paradigm. *Neuropeptides*. 2001;35(1):65–9. <https://doi.org/10.1054/npep.2000.0845>
 29. Cohen H, Kaplan Z, Koresh O, Matar MA, Geva AB, Zohar J. Early post-stressor intervention with propranolol is ineffective in preventing posttraumatic stress responses in an animal model for PTSD. *European Neuropsychopharmacology*. 2011;21(3):230–40. <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2010.11.011>
 30. Nylocks KM, Michopoulos V, Rothbaum AO, Almlil L, Gillespie CF, Wingo A, et al. An angiotensin-converting enzyme (ACE) polymorphism may mitigate the effects of angiotensin-pathway medications on posttraumatic stress symptoms. *American Journal of Medical Genetics Part B*. 2015;168(4):307–15. <https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32313>
 31. Ferrario CM, Jessup J, Chappell MC, Averill DB, Brosnihan KB, Tallant EA, et al. Effect of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibition and Angiotensin II Receptor Blockers on Cardiac Angiotensin-Converting Enzyme 2. *Circulation*. 2005;111(20):2605–10. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.104.510461>
 32. Imai Y, Kuba K, Rao S, Huan Y, Guo F, Guan B, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 protects from severe acute lung failure. *Nature*. 2005;436(7047):112–6. <https://doi.org/10.1038/nature03712>
 33. Ishiyama Y, Gallagher PE, Averill DB, Tallant EA, Brosnihan KB, Ferrario CM. Upregulation of Angiotensin-Converting Enzyme 2 After Myocardial Infarction by Blockade of Angiotensin II Receptors. *Hypertension*. 2004;43(5):970–6. <https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000124667.34652.1a>
 34. Karram T, Abbasi A, Keidar S, Golomb E, Hochberg I, Winaver J, et al. Effects of spironolactone and eprosartan on cardiac remodeling and angiotensin-converting enzyme isoforms in rats with experimental heart failure. *American Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology*. 2005;289(4):H1351–8. <https://doi.org/10.1152/ajpheart.01186.2004>
 35. Supé S, Kohse F, Gembardt F, Kuebler WM, Walther T. Therapeutic time window for angiotensin-(1–7) in acute lung injury. *British Journal of Pharmacology*. 2016;173(10):1618–28. <https://doi.org/10.1111/bph.13462>

Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства критериям ICMJE. Наибольший вклад распределен следующим образом: Ю.А. Тимошина — моделирование ПТСР-подобного состояния у мышей, первичный анализ, создание рукописи и ее редактирование; Т.С. Дейнекина — оценка общей локомоторной активности и проведение теста лабиринт Барнса, введение препаратов, редактирование рукописи; Е.В. Савинкова — проведение теста ПКЛ, СТК и теста подвешивание за хвост; В.С. Юдин — материально-техническое обеспечение; А.А. Кескинов — редактирование рукописи; В.В. Макаров — концептуализация и утверждение окончательного варианта рукописи; Э.А. Андрияжанова — концептуализация, методология, анализ данных, создание рукописи и ее редактирование, утверждение окончательного варианта рукописи, руководство исследованием.

ОБ АВТОРАХ

Тимошина Юлия Анатольевна

<https://orcid.org/0000-0002-0546-8767>
yutimoshina@cspfmba.ru

Дейнекина Татьяна Сергеевна

<https://orcid.org/0000-0003-2907-9720>
tdeinekina@cspfmba.ru

Савинкова Елена Владимировна

<https://orcid.org/0009-0007-7876-5977>
esavinkova@cspfmba.ru

Юдин Владимир Сергеевич, канд. биол. наук

<https://orcid.org/0000-0002-9199-6258>
VYudin@cspfmba.ru

Кескинов Антон Артурович, канд. мед. наук

<https://orcid.org/0000-0001-7378-983X>
Keskinov@cspfmba.ru

Макаров Валентин Владимирович, канд. биол. наук

<https://orcid.org/0000-0001-9495-0266>
Makarov@cspfmba.ru

Андрияжанова Эльмира Алиякбаровна, канд. мед. наук

<https://orcid.org/0000-0002-6441-4363>
EAnderzhanova@cspfmba.ru