

<https://doi.org/10.47183/mes.2025-337>
УДК 616.36-089



ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПАКЕТИРОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОБШИРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕЧЕНИ

А.К. Воронцов^{1✉}, Ю.А. Пархисенко², Е.Ф. Чередников², С.В. Баранников², А.А. Безалтынных¹

¹ Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск, Россия

² Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия

Введение. Травматические повреждения печени представляют собой серьезную проблему современной urgentной хирургии. Разработка новых методов хирургического гемостаза травматических повреждений печени является крайне актуальной задачей неотложной хирургии.

Цель. Разработка и апробация хирургического гемостаза при травматических повреждениях печени путем применения модифицированного пакетирования.

Материалы и методы. На кадаверном материале разработан новый метод хирургического гемостаза при травматических повреждениях печени. В клиническом исследовании приняли участие 27 пациентов с тяжелыми травматическими повреждениями печени (IV степень по AAST). Пациенты были разделены на две группы: основную ($n = 14$) и контрольную ($n = 13$). В лечении пациентов основной группы применен новый способ хирургического гемостаза травматических повреждений печени, заключающийся в тампонировании ран печени гемостатической марлей «Сургитамп», пропитанной гранулированным сорбентом «Молселект G-50», с последующим модифицированным пакетированием печени полосками полипропиленового сетчатого импланта; в контрольной группе хирургический гемостаз выполняли путем тампонирования раны печени гемостатическими губками с последующим ушиванием раны. Эффективность применения методики оценивали по следующим показателям: окончательный гемостаз, количество повторных кровотечений, количество повторных операций, летальность, длительность стационарного лечения, длительность пребывания в ОРИТ. Статистическую обработку результатов исследования проводили в программе Statistica 10.

Результаты. Применение модифицированного пакетирования в комплексном лечении пациентов с тяжелыми травматическими повреждениями печени позволило повысить надежность окончательного гемостаза с 46,2 до 92,8% ($p = 0,0391$), снизить количество повторных кровотечений и операций с 38,4 до 7,1% ($p = 0,0391$) и уменьшить уровень летальности с 38,4 до 14,2% ($p > 0,05$).

Выводы. Применение нового комбинированного метода хирургического гемостаза позволило улучшить результаты лечения пациентов с тяжелыми травматическими повреждениями печени за счет повышения надежности окончательного гемостаза, уменьшения повторных кровотечений и операций, снижения летальности.

Ключевые слова: абдоминальная травма; повреждения печени; внутрибрюшное кровотечение; хирургический гемостаз; Сургитамп; Молселект G-50; модифицированное пакетирование

Для цитирования: Воронцов А.К., Пархисенко Ю.А., Чередников Е.Ф., Баранников С.В., Безалтынных А.А. Применение модифицированного пакетирования в комплексном лечении обширных травматических повреждений печени. *Медицина экстремальных ситуаций*. 2025. <https://doi.org/10.47183/mes.2025-337>

Финансирование: исследование выполнено без спонсорской поддержки.

Соответствие принципам этики: исследование проведено с соблюдением требований и норм Хельсинкской декларации. Исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (протокол № 2 от 05.04.2022). Все пациенты подписали информированное согласие на лечение, а также использование обезличенных медицинских данных и фотографий. Кадаверный материал предоставлен бюджетным учреждением здравоохранения Воронежской области «Воронежское областное патолого-анатомическое бюро». Разрешение на предоставление кадаверного материала соответствовало положениям действующего законодательства.

Потенциальный конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

✉ Воронцов Алексей Константинович ale92112855@yandex.ru

Статья поступила: 27.06.2025 **После доработки:** 14.09.2025 **Принята к публикации:** 06.10.2025 **Online first:** 29.10.2025

APPLICATION OF MODIFIED PACKING IN THE COMBINATION TREATMENT OF EXTENSIVE TRAUMATIC LIVER INJURIES

Aleksey K. Vorontsov^{1✉}, Yuriy A. Parhisenko², Evgeniy F. Cherednikov², Sergey V. Barannikov², Aleksandr A. Bezaltynnykh¹

¹ Smolensk State Medical University, Smolensk, Russia

² Voronezh State Medical University, Voronezh, Russia

Introduction. Traumatic liver injuries are a significant challenge in modern emergency surgery. Developing new methods for surgical hemostasis of traumatic liver injuries is an extremely relevant task in urgent surgery.

Objective. Development and testing of surgical hemostasis for traumatic liver injuries using a modified packing technique.

Materials and methods. A new method of surgical hemostasis for traumatic liver injuries was developed using cadaveric material. The clinical trial included 27 patients with severe traumatic liver injuries (AAST Grade IV). Patients were divided into the main ($n = 14$) and control ($n = 13$) groups. Patients in the main group were treated using a new method of surgical hemostasis for traumatic liver injuries, involving tamponade of the liver wounds with Surgitamp hemostatic gauze impregnated with Molselect G-50 granular sorbent, followed by modified liver packing

© А.К. Воронцов, Ю.А. Пархисенко, Е.Ф. Чередников, С.В. Баранников, А.А. Безалтынных, 2025

with strips of polypropylene mesh implant. In the control group, surgical hemostasis was performed by tamponading the liver wound with hemostatic sponges followed by suturing. The effectiveness of the proposed method was evaluated based on the following parameters: definitive hemostasis, number of recurrent hemorrhages, number of recurrent operations, mortality, hospital stay duration, intensive care unit stay duration. Statistical analysis of the study results was performed using the Statistica 10 software.

Results. The application of modified packing in the combination treatment of patients with severe traumatic liver injuries increased the reliability of definitive hemostasis from 46.2% to 92.8% ($p = 0.0391$), reduced the number of re-bleeding episodes and re-operations from 38.4% to 7.1% ($p = 0.0391$), and decreased the mortality rate from 38.4% to 14.2% ($p > 0.05$).

Conclusions. The application of the new combined method of surgical hemostasis improved the treatment outcomes for patients with severe traumatic liver injuries by increasing the reliability of definitive hemostasis, reducing re-bleeding and re-operations, and lowering mortality.

Keywords: abdominal trauma; liver injuries; intra-abdominal bleeding; surgical hemostasis; Surgitamp; Molselect G-50; modified packing

For citation: Vorontsov A.K., Parhisenko Yu.A., Cherednikov E.F., Barannikov S.V., Bezaltynnykh A.A. Application of modified packing in the combination treatment of extensive traumatic liver injuries. *Extreme Medicine*. 2025. <https://doi.org/10.47183/mes.2025-337>

Funding: the study was carried out without sponsorship.

Compliance with the ethical principles: the study was conducted in compliance with the requirements and norms of the Helsinki Declaration. The study was approved by the Ethics Committee of the Voronezh State Medical University (Protocol No. 2 of 05.04.2022). All patients signed an informed consent for treatment, as well as for the use of anonymized medical data and photographs. The cadaveric material was provided by the Voronezh Regional Pathological Bureau. The permission for the provision of cadaveric material complied with the provisions of the current legislation.

Potential conflict of interest: the authors declare no conflict of interest.

✉ Aleksey K. Vorontsov ale92112855@yandex.ru

Received: 27 June 2025 **Revised:** 14 Sep. 2025 **Accepted:** 6 Oct. 2025 **Online first:** 29 Oct. 2025

ВВЕДЕНИЕ

Травматические повреждения органов брюшной полости представляют собой серьезную проблему современной ургентной хирургии. По статистике травмы живота составляют от 1,5 до 36,5% из числа всех травматических повреждений. Однако частота летальных исходов при повреждениях органов брюшной полости достигает крайне высоких цифр — порядка 60%. При этом большая часть пострадавших находится в молодом и трудоспособном возрасте, что определяет большую медико-социальную значимость проблемы травматических повреждений органов брюшной полости [1, 2].

Особую группу повреждений при абдоминальной травме составляют повреждения паренхиматозных органов. Наиболее часто в клинической практике встречаются повреждения селезенки. Травмы печени в структуре повреждений паренхиматозных органов брюшной полости находятся на втором месте, однако представляют собой крайне сложную проблему для мировой хирургии. Тяжелые повреждения печени зачастую сопровождаются развитием трудноконтролируемого внутрибрюшного кровотечения и развитием печеночно-клеточной недостаточности в послеоперационном периоде при массивном размозжении печени, что является основными причинами неудовлетворительных результатов лечения пострадавших с травмой печени и высоких показателей летальности (до 50% и более) при данных повреждениях [3–5].

Большинство исследований последнего времени, касающихся проблемы травматических повреждений печени, направлены на совершенствование тактических подходов лечения травмы печени, применение технологий эндоваскулярного гемостаза и улучшение методов хирургического гемостаза повреждений печени [6].

Среди тактических подходов лечения тяжелых сочетанных повреждений все большее распространение получает стратегия этапного хирургического лечения «damage control surgery», направленная на сокращение

первой фазы оперативного лечения с последующей стабилизацией состояния больного и проведением основного этапа хирургического лечения в более благоприятных условиях. Применение стратегии «damage control surgery» в настоящее время показывает хорошие результаты, однако не решает все проблемы хирургического лечения тяжелых травматических повреждений печени из-за развития ранних рецидивных кровотечений у пациентов с массивным повреждением печеночной паренхимы [7–9].

Важным современным достижением в лечении абдоминальной травмы, и прежде всего внутрибрюшных кровотечений, стало применение тактики консервативного лечения (Non-Operative Management, NOM) [10, 11]. Тактика NOM подразумевает проведение строгого отбора пациентов, оснащение стационаров рентген-эндоваскулярными операционными с обязательной системой динамического мониторинга за состоянием пациентов [12]. Однако большинство российских стационаров, оказывающих экстренную помощь пациентам с абдоминальной травмой, не имеют соответствующего оснащения, что ограничивает возможности применения тактики NOM в лечении пациентов с повреждениями печени [13].

На сегодняшний день основным методом лечения тяжелых травматических повреждений печени у пациентов с нестабильной гемодинамикой является экстренное оперативное вмешательство — срединная лапаротомия, главной задачей которой является надежная остановка внутрибрюшного кровотечения [14, 15]. Разработаны и применяются в клинической практике множество способов гемостаза повреждений печени, как временных, так и окончательных, но ни один из них в настоящее время в полной мере не удовлетворяет хирургов из-за высокой частоты повторных кровотечений в послеоперационном периоде [16, 17]. Разработка новых методов хирургического гемостаза травматических повреждений печени является крайне актуальной задачей современной ургентной хирургии [18].

Цель исследования — разработка и апробация хирургического гемостаза при травматических повреждениях печени путем применения модифицированного пакетирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ


Предварительно нами были проведены экспериментальные исследования по изучению возможности применения технологии хирургического гемостаза модифицированным пакетированием у лабораторных животных [19].

Также предварительно выполнены исследования на кадаверном материале с целью разработки методики оперативного вмешательства по применению модифицированного пакетирования. Исследования проведены на 7 нефиксированных трупах мужчин в возрасте $34,5 \pm 3,2$ года, умерших от причин, не связанных с травматическими повреждениями и заболеваниями органов брюшной полости, предоставленных бюджетным

учреждением здравоохранения Воронежской области «Воронежское областное патологоанатомическое бюро». Разрешение на предоставление кадаверного материала соответствовало положениям действующего законодательства¹. Временной промежуток от момента смерти до проведения исследования составил не более 24 ч.

На каждом объекте исследования моделировали травматическое повреждение печени. Для этого после проведения тотальной лапаротомии в рану выводили правую долю печени, которую помещали на подставку-столик.

На расстоянии 40 см от поверхности печени с помощью нити к лабораторному штативу крепили стальной груз массой 250 г. По готовности нить, фиксирующая груз, пережигалась пламенем газовой горелки, груз падал в вертикальном направлении и ударялся о диафрагмальную поверхность правой доли печени, что приводило к формированию раны печени (рис. 1А). Моделированную рану печени туго тампонируют



Фотографии предоставлены авторами

Рис. 1. Этапы модифицированного пакетирования печени на кадаверном материале: А — моделированная ушибленная рана правой доли печени; Б — тампонирующая рана печени гемостатическим материалом «Сургитамп»; В — нанесение гранулированного сорбента «Молселект G-50»; Г — фиксация полосок полипропиленового сетчатого импланта к диафрагме; Д — фиксация полосок сетчатого импланта по висцеральной поверхности печени; Е — окончательный вид печени после модифицированного пакетирования

¹ Постановление Правительства Российской Федерации № 750 «Об утверждении Правил передачи невестребованного тела, органов и тканей умершего человека для использования в медицинских, научных и учебных целях, а также использования невестребованного тела, органов и тканей умершего человека в указанных целях» (с изменениями и дополнениями) от 21.07.2012.

гемостатической марлей «Сургитамп» (рис. 1Б), пропитанной гранулированным сорбентом «Молселект G-50» (рис. 1В), затем сдавливали правую долю печени марлевыми салфетками.

С целью проведения модифицированного пакетирования проводили мобилизацию правой доли печени. Для этого ножницами пересекали правую треугольную, венечную, серповидную и круглую связки печени, после чего правую долю печени выводили в рану. Затем полосу (шириной 4,0 см и длиной 30,0 см) из сетчатого полипропиленового импланта, используемого для пластики грыж, фиксировали в сагиттальной плоскости. Для этого край полосы сетчатого импланта подшивали к диафрагме тремя отдельными узловыми швами полипропиленовой мононитью (рис. 1Г). Далее обортывали диафрагмальную поверхность печени с переходом на висцеральную поверхность, сетчатый имплант натягивали для обеспечения компрессии и его нижний край фиксировали узловыми швами к краю начала полосы, создавая компрессию и натяжение. Важно проводить модифицированное пакетирование, отступив от краев желчного пузыря на 1,0–1,5 см, в дальнейшем его окутывали большим сальником (рис. 1Д).

С целью обеспечения дополнительной компрессии в поперечном направлении относительно правой доли печени подшивали три дополнительные полипропиленовые сетчатые полосы (рис. 1Е). Полоски окутывали большим сальником, фиксировали его отдельными узловыми швами к капсуле печени для профилактики возникновения кишечных свищей.

Следующим этапом исследования была клиническая апробация применения технологии модифицированного пакетирования у пострадавших с повреждениями печени. Пилотное рандомизированное контролируемое клиническое исследование проведено на базе Брянской городской больницы № 1, Воронежской областной клинической больницы № 1, Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1, Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 10. В исследовании приняли участие 27 пострадавших с травматическим повреждением печени. Дизайн клинического исследования представлен на рисунке 2.

Критерии включения пациентов в исследование: закрытая травма живота; возраст пострадавших 18–80 лет; подписанное информированное согласие на участие в клиническом исследовании; степень повреждения печени согласно классификации американского общества хирургов и травматологов (American Association for the Surgery of Trauma, AAST) — IV [19]. Критерии невключения пациентов в исследование: отказ от участия в клиническом исследовании; агональное состояние пациента; аллергические реакции на «Молселект G-50», «Сургитамп» и полипропиленовый сетчатый имплант. Критерии исключения пациентов из исследования: отказ от продолжения участия в клиническом исследовании; повреждение полых органов, перитонит; повреждение печени I–III степени по AAST; множественные повреждения органов брюшной полости; макроскопические признаки цирроза печени; количество баллов по шкале военно-полевой хирургии для определения хирургической тактики > 13 баллов.

В зависимости от целей и задач исследования пациенты были разделены на две группы: основную (14 пациентов) и контрольную (13 пациентов). Распределение больных производили методом случайной выборки с использованием генератора случайных чисел. Больные были сопоставимы по полу, возрасту, характеру травматического повреждения печени, структуре сочетанных повреждений и тяжести кровопотери.

В основной группе пациентов для хирургического гемостаза травматических повреждений печени применяли метод, представленный в патенте [20]. В контрольной группе применялся метод хирургического гемостаза ран печени путем тампонирувания ран печени гемостатическими коллагеновыми губками с последующим ушиванием раны печени мононитью ПГА 2,0.

В комплексном лечении больные обеих групп в послеоперационном периоде использовали стандартное консервативное лечение, включающее гемостатическую и инфузионную терапии, гемотрансфузии по показаниям, антибактериальную терапию, анальгетики и перевязки.

Результаты исследования оценивали по показателям окончательного гемостаза, количеству повторных кровотечений и повторных операций, времени оперативного вмешательства, длительности пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии, длительности стационарного лечения, летальности, наличию и характеру осложнений в послеоперационном периоде.

Статистическую обработку результатов исследования проводили в программе Statistica 10. Вычисляли стандартные описательные статистики (среднее значение (M), стандартную ошибку среднего значения (m), медиану (M_e), нижний (Q_1) и верхний (Q_3) квартили). Для оценки нормальности распределения количественных показателей использовали критерий Шапиро – Уилка. Значимость различий количественных признаков в независимых группах определяли с использованием t -критерия Стьюдента (при нормальном распределении признака) и U -критерия Манна – Уитни (при распределении отличном от нормального). Анализ качественных признаков проводили с использованием критериев Фишера и Z -критерия с поправкой Йейтса. Различия признаков считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общая характеристика пациентов, принявших участие в исследовании, представлена в таблице 1.

В таблице 1 представлены сводные данные о группах пациентов. Так, наиболее часто травматические повреждения печени встречались у мужчин трудоспособного возраста (20 (74,1%)). У женщин травматические повреждения встречались значительно реже: у 7 (25,9%) пострадавших. Средний возраст пациентов с травматическими повреждениями печени составил 36 [30; 43] лет. Анализируя механизм абдоминальной травмы, следует отметить, что среди причин травматических повреждений печени преобладали дорожно-транспортные происшествия (12 (44,5%) пациентов), реже встречалась кататравма (падение с высоты) (9 (22,2%) пациентов) и бытовая травма (6 (22,2%) пациентов).




Рисунок подготовлен авторами

Рис. 2. Дизайн клинического исследования: ASA — Американское общество анестезиологов; ВПХ-шкала — шкалы объективной оценки тяжести повреждений, разработанные на кафедре военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии; ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии.

Среди сочетанных повреждений наиболее часто встречались повреждения грудной клетки 17 (32,5%), реже — скелетная травма 9 (8,5%), черепно-мозговая травма 8 (59,0%) и повреждение таза 5 (18,5%).

При анализе сопутствующей патологии установлено, что пациенты с абдоминальной травмой и повреждениями печени были практически соматически здоровы. Лишь у 4 (14,8%) пациентов была выявлена сопутствующая патология: у 1 (3,7%) пациента — ишемическая болезнь сердца, у 3 (11,1%) пострадавших — хронический панкреатит.

В комплексном лечении пациентов основной группы был применен новый комбинированный метод

хирургического гемостаза травматических повреждений печени, заключающейся в тампонировании ран печени гемостатической марлей «Сургитамп», пропитанной гранулированным сорбентом «Молселект G-50», с последующим модифицированным пакетированием печени полосками полипропиленового сетчатого имплантата [20] (рис. 3А–Е).

В работе установлено, что сразу после тампонирования раны печени гемостатической марлей «Сургитамп», пропитанной гранулированным сорбентом «Молселект G-50», набухающим при контакте с кровью и увеличивающимся в объеме, он превращался в пропитанный кровью гидрогель. Гемостатическая

Таблица 1. Характеристика групп исследования

Показатель	Основная группа (n = 14)	Контрольная группа (n = 13)	Уровень статистической значимости, p
Работающие, n (%)	3 (21,4%)	5 (38,5%)	>0,05
Неработающие, n (%)	8 (57,2%)	8 (61,5%)	>0,05
Пенсионеры, n (%)	3 (21,4%)	0	нд
Возраст, годы $M_e [Q_1; Q_3]$	40 [54,0; 79,0]	36,7 [37,0; 61,0]	>0,05
Мужчины, n (%)	10 (58,7%)	10 (78,2%)	>0,05
Женщины, n (%)	4 (41,3%)	3 (21,8%)	>0,05
Автодорожная травма, n (%)	5 (35,7%)	7 (53,8%)	>0,05
Падение с высоты, n (%)	5 (21,4%)	4 (23,1%)	>0,05
Бытовая травма, n (%)	4 (28,6%)	2 (15,4%)	>0,05
Ишемическая болезнь сердца, n (%)	1 (83,2%)	0	нд
Хронический панкреатит, n (%)	1 (8,4%)	2 (9,0%)	>0,05
Черепно-мозговая травма, n (%)	4 (60,5%)	4 (50,0%)	>0,05
Повреждения грудной клетки, n (%)	9 (30,9%)	8 (41,6%)	>0,05
Скелетная травма, n (%)	5 (8,6%)	4 (8,4%)	>0,05
Повреждение костей таза, n (%)	3 (21,4%)	2 (15,3%)	>0,05
II, n (%)	5 (35,7%)	4 (30,8%)	>0,05
III, n (%)	7 (50%)	8 (61,5%)	>0,05
IV, n (%)	2 (14,3%)	1 (7,7%)	>0,05
III, n (%)	4 (28,6%)	3 (23,2%)	>0,05
IV, n (%)	6 (42,8%)	5 (38,4%)	>0,05
V, n (%)	4 (28,6%)	5 (38,4%)	>0,05

Таблица составлена авторами по собственным данным

Примечание: нд — недостаточно данных; n — количество пациентов в группе.


марля «Сургитамп» обеспечивала компрессию и усиление гемостатического эффекта. Сдавление печени руками приводило к временному гемостазу. Однако при ослаблении компрессии кровотечение возобновлялось.

С целью достижения окончательного гемостаза применяли метод модифицированного пакетирования полосками полипропиленового сетчатого импланта (технология фиксации сетчатого импланта описана выше), что приводило к окончательной остановке кровотечения. Окончательный гемостаз в основной группе был достигнут у 13 (92,8%) пациентов. У 1 (7,14%) пациента основной группы на 2 сут после операции наблюдали признаки возобновления кровотечения. Пациент в экстренном порядке был оперирован. При ревизии органов брюшной полости установлен источник кровотечения — диффузное подтекание крови из раны печени за счет недостаточной компрессии при натяжении полосок полипропиленового сетчатого импланта. Дополнительное

натяжение полосок привело к остановке кровотечения и окончательному гемостазу.

В основной группе умерло 2 (14,3%) пациента. Причиной летальных исходов явилась тяжелая сочетанная травма. По данным судебно-медицинского вскрытия, признаков повторного внутрибрюшного кровотечения в обоих случаях не наблюдалось.

В контрольной группе с целью достижения окончательного гемостаза повреждений печени рана тампонировалась гемостатическими коллагеновыми губками. Губки активно пропитывались кровью, однако диффузное кровотечение из ран печени сохранялось. Для достижения окончательного гемостаза раны печени ушивались П-образным швом (монопнитью ПГА 2.0) до сближения краев раны. При прошивании ран печени наблюдали диффузное подтекание крови из мест вколов иглы, паренхима печени прорезалась шовным материалом, что затрудняло достижение окончательного гемостаза и удлиняло время проведения оперативно-го вмешательства. У 5 (38,4%) пациентов контрольной



Фотографии предоставлены авторами

Рис. 3. Этапы выполнения модифицированного пакетирования у пациента с повреждением печени: А — внешний вид травматического разрыва V, VI, VII сегментов правой доли печени (AAST IV); Б — тампонирование раны гемостатическим материалом «Сургитамп», пропитанного гранулированным сорбентом «Молселект G-50», временная тампонада марлевым полотенцем; В — фиксация полосок полипропиленового импланта к диафрагме; Г, Д — фиксация полосок сетчатого импланта в поперечном направлении; Е — окончательный вид операционной раны

группы на 2–3 сут после операции наблюдали признаки повторного кровотечения. Больные были оперированы в экстренном порядке. Источником кровотечения во всех случаях было подтекание крови из разрывов печени. В контрольной группе умерли 5 (38,4%) пациентов на фоне острой кровопотери, постгеморрагической анемии, а также сочетанных повреждений.

Сравнительная эффективность применения модифицированного пакетирования в лечении травматических повреждений печени представлена в таблице 2.

Применение модифицированного пакетирования в комплексном лечении пациентов с тяжелыми травматическими повреждениями печени (класс IV по AAST) позволило повысить надежность окончательного гемостаза с 46,2 до 92,8% ($p = 0,0391$), снизить количество повторных кровотечений и операций с 38,4 до 7,1% ($p = 0,0391$) и уменьшить летальность с 38,4 до 14,2% ($p > 0,05$).

Анализ послеоперационных хирургических осложнений в группах исследования показал, что в послеоперационном периоде у 1 пациента основной группы

было повторное кровотечение. Пациент в экстренном порядке был оперирован. При ревизии органов брюшной полости источником кровотечения оказалось диффузное подтекание крови из раны печени за счет недостаточной компрессии при натяжении полосок полипропиленового сетчатого импланта. Дополнительное натяжение полосок привело к остановке кровотечения и окончательному гемостазу.

В контрольной группе у 5 пациентов в послеоперационном периоде отмечали признаки повторного кровотечения. Пациенты были повторно оперированы. Интраоперационно выявлено прорезывание швов паренхимы печени, выполнен дополнительный гемостаз в объеме электрокоагуляции, нанесением на место диффузного подтекания крови пластины Тахокомба или дополнительным прошиванием мест разрывов. У одного пациента контрольной группы в послеоперационном периоде появились жалобы на боли в правом подреберье, слабость, было выполнено УЗИ брюшной полости, выявлена билома брюшной полости. Последнее осложнение потребовало пункционного

Таблица 2. Сравнительная эффективность лечения пациентов с травматическими повреждениями печени

Показатель	Основная группа (n = 14)	Контрольная группа (n = 13)	Уровень статистической значимости, p
Окончательный гемостаз, n (%)	13 (92,8%)	6 (46,2%)	0,0391
Повторные кровотечения, n (%)	1 (7,1%)	5 (38,4%)	0,0391
Повторные операции, n (%)	1 (7,1%)	5 (38,4%)	0,0391
Летальность, n (%)	2 (14,2%)	5 (38,4%)	>0,05
Медиана длительности стационарного лечения, койко-дни	10,0 [9,0; 14,0]	16,0 [10,0; 18,0]	>0,05
Медиана времени оперативного вмешательства, мин	100,0 [85,0; 120,0]	130,0 [120,0; 150,0]	0,0022
Медиана длительности пребывания в ОРИТ, койко-дни	3,0 [1,0; 4,0]	5,0 [3,0; 6,0]	0,011
Медиана объема трансфузии эритроцитарной взвеси, мл	1140 [1100; 1200]	1230 [1150; 1900]	0,0272
Медиана объема трансфузии СЗП, мл	1175 [1100; 1250]	1430 [1350; 2100]	0,0001
Послеоперационные осложнения (по Clavien–Dindo)			
III, n (%)	1 (7,1%)	5 (38,4%)	>0,05
IIIa, n (%)	–	1 (7,7%)	нд
IV, n (%)	–	1 (7,7%)	нд
V, n (%)	2 (14,2%)	5 (38,4%)	>0,05

Таблица составлена авторами по собственным данным

Примечание: нд — недостаточно данных; n — количество пациентов в группе.

дренирующего вмешательства под контролем УЗИ. Исход — полное разрешение, пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторный этап на 18 сутки. У одного пациента в послеоперационном периоде на фоне острой массивной кровопотери развился ДВС-синдром, который потребовал интенсивной терапии в условиях ОРИТ; данное осложнение разрешилось.

ОБСУЖДЕНИЕ

Повреждения органов брюшной полости представляют собой одну из наиболее сложных и во многом не решенных проблем неотложной хирургии [5, 9]. В структуре травматизма при абдоминальной травме повреждения печени находятся на втором месте, уступая лишь повреждениям селезенки. Однако наиболее высокие показатели летальности (14–58%) у пациентов с закрытой травмой живота приходятся именно на тяжелые повреждения печени, что обусловлено массивным внутрибрюшным трудноконтролируемым кровотечением и развитием печеночно-клеточной недостаточности в послеоперационном периоде [13, 18].

Самой частой причиной летальных исходов при абдоминальной травме являются травматические разрывы печени, осложненные массивным кровотечением. В таких случаях основное значение имеют два фактора: своевременность и быстрота проведения оперативного

вмешательства и применение надежного эффективно-го способа хирургического гемостаза [6].

Большинство хирургов в экстренных случаях применяют ушивание ран, электрокоагуляцию, тампони-рование. Существенным недостатком при этом счита-ется появление ишемических зон некроза между швами. При глубоких повреждениях используют там-пони-рование ран сальником, различными гемоста-тическими губками, пленками, порошкообразными гемостатиками. Но, как показывает практика, они ока-зываются малоэффективными. Тампонада глубоких ран полотенцем, салфеткой или любым нерассасыва-ющимся материалом вызывает необходимость прове-дения повторных операций [3].

При обширных травматических повреждениях пе-чени эффективным способом остановки кровотечения является пакетирование разрывов печени полипропи-леновым сетчатым имплантом. При этом производится мобилизация печени от всех связок с обязательным сохранением оттока крови по венам. Но в послеопера-ционном периоде после стабилизации состояния всех пациентов необходимо повторно оперировать для про-ведения окончательного хирургического пособия [1].

Приведенные данные свидетельствуют, что суще-ствует множество способов гемостаза при повреж-дениях печени, но ни один из них не удовлетворяет хирургов. В этой связи разработка новых способов хи-рургического гемостаза травматических повреждений

печени является актуальной проблемой urgentной хирургии.

Перед началом клинического исследования нами были проведены многофункциональные интегрированные морфологические, морфометрические, иммуногистохимические исследования на лабораторных животных по разработке нового способа хирургического гемостаза [3]. В серии экспериментов *in vivo* изначально было показано, что применение гемостатика «Сургитамп» и сорбента «Молселект G-50» эффективно останавливает умеренное паренхиматозное кровотечение на моделях кровоточащих ран печени, а в эксперименте на моделях с активным кровотечением из ран печени разработанная методика комбинированного хирургического гемостаза с применением гемостатических средств и модифицированного пакетирования показала высокую эффективность местного гемостаза [19].

В соответствии с целью нашего клинического исследования разработанный новый способ

хирургического гемостаза с модифицированным пакетированием [20] был применен у самой тяжелой категории пациентов с травматическим повреждением печени, осложненным активным кровотечением (IV степени по AAST).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан и внедрен в клиническую практику новый метод хирургического гемостаза, реализующийся путем тампонирувания ран печени гемостатической марлей «Сургитамп», пропитанной гранулированным сорбентом «Молселект G-50», с последующим модифицированным пакетированием печени полосками полипропиленового сетчатого эндопротеза. Это позволило улучшить результаты лечения пациентов с тяжелыми травматическими повреждениями печени за счет повышения надежности окончательного гемостаза, уменьшения повторных кровотечений и операций, снижения уровня летальности.

Литература / References

- García IC, Villalba JS, Iovino D, Franchi C, Iori V, Pettinato G, et al. Liver Trauma: Until When We Have to Delay Surgery? A Review. *Life*. 2022;12(5):694. <https://doi.org/10.3390/life12050694>
- Corvino F, Giurazza F, Marra P, Ierardi AM, Corvino A, Basile A, et al. Damage Control Interventional Radiology in Liver Trauma: A Comprehensive Review. *Journal of Personalized Medicine*. 2024;14(4):365. <https://doi.org/10.3390/jpm14040365>
- Воронцов АК, Пархисенко ЮА, Чередников ЕФ, Баранников СВ, Черных АВ, Безалтынных АА и др. Экспериментальное обоснование применения нового метода хирургического гемостаза обширных травматических повреждений печени. *Волгоградский научно-медицинский журнал*. 2023;20(2):45–50. Vorontsov AK, Parkhisenko YuA, Cherednikov EF, Barannikov SV, Chernykh AV, Bezaltynnykh AA, et al. Experimental justification for the use of a new method of surgical hemostasis of extensive traumatic liver injuries. *Volgograd Scientific Medical Journal*. 2023;20(2):45–50 (In Russ.). EDN: [HSJMKR](https://doi.org/10.17116/hirurgia202007189)
- Евтихов АВ, Любимый ЕД, Ким ВЛ. Клинические наблюдения тяжелых травматических повреждений печени. *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова*. 2020;7:89–92. Evtikhov AV, Lyubiviy ED, Kim VL. Clinical observations of severe traumatic liver injuries. *Pirogov Russian Journal of Surgery*. 2020;7:89–92 (In Russ.). <https://doi.org/10.17116/hirurgia202007189>
- Александров ВВ, Маскин СС, Алимов МН, Бирюлев ДС, Матюхин ВВ, Рашид А и др. Закрытая травма печени. Систематический обзор. *Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»*. 2025;14(1):141–54. Aleksandrov VV, Maskin SS, Alimov MN, Biryulev DS, Matyukhin VV, Rashid A, et al. Closed liver injury. A systematic review. *Russian Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care"*. 2025;14(1):141–54 (In Russ.). <https://doi.org/10.23934/2223-9022-2025-14-1-141-154>
- Coccolini F, Coimbra R, Ordonez C, Kluger Y, Vega F, Moore EE, et al. Liver trauma: WSES 2020 guidelines. *World Journal of Emergency Surgery*. 2020;15(1):24. <https://doi.org/10.1186/s13017-020-00302-7>
- Benz D, Balogh ZJ. Damage control surgery: current state and future directions. *Current Opinion in Critical Care*. 2017;23(6):491–7. <https://doi.org/10.1097/mcc.0000000000000465>
- Ordoñez CA, Parra MW, Millán M, Caicedo Y, Guzman-Rodriguez M, Padilla N, et al. Damage Control in Penetrating Liver Trauma: Fear of the Unknown. *Colombia Médica*. 2020;51(4):e4134365.
- Чубарян КА, Грошили ЮВ, Лукаш ВС. Возможности улучшения результатов хирургического лечения пациентов с тяжелыми травмами печени. *Политравма*. 2024;3:19–27. Chubaryan KA, Groshilin YuV, Lukash VS. Possibilities of improving the results of surgical treatment of patients with severe liver injuries. *Polytrauma*. 2024;3:19–27 (In Russ.). <https://doi.org/10.24412/1819-1495-2024-3-19-27>
- Brooks A, Reilly JJ, Hope C, Navarro A, Naess PA, Gaarder C. Evolution of non-operative management of liver trauma. *Trauma Surgery and Acute Care Open*. 2020;5(1):e000551. <https://doi.org/10.1136/tsaco-2020-000551>
- Iacobellis F, Di Serafino M, Caruso M, Dell'Aversano Orabona G, Rinaldo C, Grimaldi D, et al. Non-Operative Management of Polytraumatized Patients: Body Imaging beyond CT. *Diagnostics*. 2023;13(7):1347. <https://doi.org/10.3390/diagnostics13071347>
- Александров ВВ, Маскин СС, Ермолаева НК, Матюхин ВВ. Консервативное ведение пациентов с закрытой травмой паренхиматозных органов брюшной полости и забрюшинного пространства, с забрюшинными кровоизлияниями — показания, методика и целесообразность. *Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»*. 2021;3:540–7. Aleksandrov VV, Maskin SS, Ermolaeva NK, Matyukhin VV. Conservative management of patients with closed trauma of parenchymal organs of the abdominal cavity and retroperitoneal space, with retroperitoneal hemorrhages — indications, methodology and feasibility. *Russian Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care"*. 2021;3:540–7 (In Russ.). <https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-540-548>
- Гавришук ЯВ, Мануковский ВА, Тулупов АН, Демко АЕ, Колчанов ЕА, Савелло ВЕ и др. Диагностика и лечение повреждений печени при закрытой травме живота с ис-

- пользованием малоинвазивных технологий. *Вестник хирургии им. И.И. Грекова*. 2022;181(3):28–36. Gavrishchuk YaV, Manukovsky VA, Tulupov AN, Demko AE, Kolchanov EA, Savello VE, et al. Diagnostics and treatment of liver injuries in blunt abdominal trauma using minimally invasive technologies. *Grekov's Bulletin of Surgery*. 2022;181(3):28–36 (In Russ.). <https://doi.org/10.24884/0042-4625-2022-181-3-28-36>
14. Подолужный ВИ, Радионов ИА, Пельц ВА, Старцев АБ, Краснов КА, Шаталин ВА. Травматическое повреждение печени. *Политравма*. 2023;1:34–8. Podoluzhny VI, Radionov IA, Pelts VA, Startsev AB, Krasnov KA, Shatalin VA. Traumatic liver injury. *Polytrauma*. 2023;1:34–8 (In Russ.). <https://doi.org/10.24412/1819-1495-2023-1-34-38>
15. Липатов ВА, Лазаренко СВ, Северинов ДА, Денисов АА, Чупахин ЕГ, Анискина ЕН. Сравнительный анализ эффективности новых образцов местных гемостатических средств. *Медицина экстремальных ситуаций*. 2023;25(4):131–6. Lipatov VA, Lazarenko SV, Severinov DA, Denisov AA, Chupakhin EG, Aniskina EN. Comparative analysis of the effectiveness of new samples of local hemostatic agents. *Extreme Medicine*. 2023;25(4):131–6 (In Russ.). <https://doi.org/10.47183/mes.2023.063>
16. Бараников СВ, Чередников ЕФ, Полубкова ГВ, Банин ИН, Болховитинов АЕ, Бережной СИ и др. Применение альгинатного полимерного полисахаридного гемостатического гидрогеля при продолжающемся артериальном кровотечении из пептической язвы гастроэнтероанастомоза (клинический случай). *Медицина экстремальных ситуаций*. 2025;27(2):235–42. Barannikov SV, Cherednikov EF, Polubkova GV, Banin IN, Bolkhovitinov AE, Berezhnoy SI, et al. Use of alginate polymer polysaccharide hemostatic hydrogel in ongoing arterial bleeding from a peptic ulcer of a gastroenteroanastomosis (clinical case). *Extreme Medicine*. 2025;27(2):235–42 (In Russ.). <https://doi.org/10.47183/mes.2025-243>
17. Гавришук ЯВ, Мануковский ВА, Тулупов АН, Демко АЕ, Колчанов ЕА, Киселев МА и др. Лечение пострадавшей с закрытой травмой печени с использованием интервенционных методов. *Вестник экспериментальной и клинической хирургии*. 2023;16(4):316–20. Gavrishchuk YaV, Manukovsky VA, Tulupov AN, Demko AE, Kolchanov EA, Kisilev M, et al. Treatment of a victim with closed liver injury using interventional methods. *Bulletin of Experimental and Clinical Surgery*. 2023;16(4):316–20 (In Russ.). <https://doi.org/10.18499/2070-478X-2023-16-4-316-320>
18. Tinkoff G, Esposito TJ, Reed J, Kilgo P, Fildes J, Pasquale M, et al. American Association for the Surgery of Trauma Organ Injury Scale I: spleen, liver, and kidney, validation based on the National Trauma Data Bank. *Journal of the American College of Surgeons*. 2008;207(5):646–55. <https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2008.06.342>
19. Воронцов АК, Пархисенко ЮА, Чередников ЕФ, Бараников СВ, Безалтынних АА, Черных АВ. Использование гемостатической марли Сургитамп и гранулированного сорбента Молселект G-50 в лечении экспериментальных кровотокающих ран печени. *Вестник экспериментальной и клинической хирургии*. 2023;1(16):52–9. Vorontsov AK, Parkhisenko YuA, Cherednikov EF, Barannikov SV, Bezaltynnykh AA, Chernykh AV. Hemostatic Gauze Surgitamp and Granular Sorbent Molselect G-50 Application in the Treatment of Simulated Bleeding Liver Wounds. *Journal of Experimental and Clinical Surgery*. 2023;1(16):52–9 (In Russ.). <https://doi.org/10.18499/2070-478X-2023-16-1-52-59>
20. Воронцов АК, Пархисенко ЮА, Воронцов КЕ, Безалтынних АА. Способ хирургического лечения больных с тяжелыми травмами печени. Патент Российской Федерации № 2674874 C1; 2018. Vorontsov AK, Parkhisenko YuA, Vorontsov KE, Bezaltynnykh AA. A method of surgical treatment for patients with severe liver injuries. Patent of Russian Federation № 2674874 C1; 2018 (In Russ.). EDN: ZECXBR

Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства критериям ICMJE. Наибольший вклад распределен следующим образом: А.К. Воронцов — анализ литературы, проведение оперативного вмешательства, курация пациентов, подготовка черновика рукописи; Ю.А. Пархисенко — концепция и дизайн исследования, окончательное согласование версии статьи; Е.Ф. Чередников — редактирование рукописи; С.В. Баранников — обзор литературы, анализ полученных данных; А.А. Безалтынных — сбор и обработка материала.

ОБ АВТОРАХ

Воронцов Алексей Константинович, канд. мед. наук
<https://orcid.org/0000-0002-3730-1005>
ale92112855@yandex.ru

Пархисенко Юрий Александрович, д-р мед. наук
<https://orcid.org/0000-0002-6486-9405>
parkhisenko46@mail.ru

Чередников Евгений Федорович, д-р мед. наук
<https://orcid.org/0000-0003-2048-6303>
facult-surg.vsmuburdenko@yandex.ru

Баранников Сергей Викторович, канд. мед. наук
<https://orcid.org/0000-0002-2620-9836>
svbarannikov89@gmail.com

Безалтынных Александр Александрович, д-р мед.
наук
<https://orcid.org/0000-0001-5629-1538>
bezaltyna@yahoo.com